

ΜΕΤΕΞΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΟΧΗ! ΦΡΟΝΤΙΔΑ...

Αποφύγετε μετά από μία εξαγωγή την κοπιαστική εργασία.

Μπορείτε να φάτε και να πιείτε αφού περάσει η επήρεια της αναισθησίας και μετά από 2-3 ώρες από την εξαγωγή!

Οι τροφές και τα ποτά την πρώτη ημέρα πρέπει να είναι κρύα και δυνατόν να αποφεύγονται τα γαλακτοκομικά προϊόντα.

Από το μετεξακτικό φατνίο (πληγή), είναι δυνατόν την πρώτη ημέρα να τρέχει λίγο αίμα. Αυτό δεν πρέπει να σας ανησυχήσει, αντιθέτως πρέπει να καταπίνετε το σάλιο και να μην φτύνετε συνέχεια.

Εάν έχετε έντονη αιμορραγία, τοποθετήστε πιεστικά μία γάζα ή βαμβάκι βρεγμένο για περίπου είκοσι λεπτά της ώρας. Εάν παραταύτα δεν σταματήσει η αιμορραγία, αναζητήστε τον οδοντίατρο σας!



Φάρμακα που έχουν τοποθετηθεί μέσα στο φατνίο από τον οδοντίατρο δεν θα τα πειράξετε, αυτά θα απορροφηθούν από τον οργανισμό.

Σε περίπτωση πόνου πάρτε ένα DEPON ή PONSTAN όχι ασπιρίνη!

Ο ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ ΣΑΣ

Αισθητική και Χειρουργική Αθανάσιος Πολυχρονίδης (Aesthetic and Surgery Polydds Dentaloffice) Ιατρείο: ΔΟΪΡΑΝΗΣ 26 & ΠΑΠΑΦΗ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 54638 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τηλ.: 2310868268
web: www.polydds.gr email: polydds@hotmail.com